

UPPLYSNINGAR

1.
Vid "övrigt" kan andra förekommande symptom anges, liksom diagnos, om den kan tänkas påverka förloppet. Ange även eventuell medicinering som kan påverka reaktionen, andra infusioner etc. Tidigare misstänkta transfusionsreaktioner ska också anges.
2.
Klistra etikett/er alternativt skriv av enhetens/ernas nummer. Ange även nyligen avslutade transfusioner.
3.
Vid **lätta** snabbt övergående reaktioner är provtagning **ej** nödvändig, men rapportering på denna blankett ska ske till blodcentralen.

Ta vid **måttliga** och **svårare** reaktioner ett 7mL EDTA-rör.

Lämna prover och remiss till blodcentralen. Lämna även blodenheten, väl försluten, i separat plastpåse.

Med ledning av uppgifter om patientens symptom, vid inträffad transfusionsreaktion, avgör blodcentralens läkare, vilka åtgärder som ska vidtagas med de inlämnade proverna.

Vid misstanke om transfusionsreaktion till följd av **bakteriellt kontaminerad** enhet, måste blodenheten snarast lämnas till blodcentralen. Odling på blodenheten ombesörjes av blodcentralen. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen/mottagningen.

Vid oklarheter angående rapportering och tillvaratagande av material som använts vid transfusion med reaktion/er, tag kontakt med blodcentralen.